

AVIFAUNA DEL ITINERARIO DE LLUCENA A SANT JOAN DE PENYAGOLOSA

Nombre común	Hàbitat preferente de observación	Época de observación
Azor común	Arbolado de <i>pinus</i> y <i>quercus</i> en mosaico con matorral esclerófito y áreas abiertas	Todo el año
Gavilán común	Arbolado de <i>pinus</i> y <i>quercus</i> con buena cobertura	Todo el año
Andarríos chico		Todo el año
Mito	Arbolado en mosaico con matorral desarrollado	Todo el año
Alondra común	Cultivos con pastizales y matorral ralo como brezales o tomillares y aliagar mediterráneo	Todo el año
Martin pescador común	Zonas húmedas	Todo el año
Perdiz roja	Zonas agrícolas de secano con mosaico de matorral mediterráneo y arbolado disperso	Todo el año
Águila real	Cortados rocosos y canitles	Todo el año
Búho chico	Arbolados de <i>pinus</i>	Todo el año
Mochuelo europeo	Zonas agrícolas con arbolado disperso y eriales	Todo el año
Búho real	Roquedos, canchales, barrancos rocosos	Todo el año
Busardo ratonero	Arbolados en mosaico	Todo el año
Pardillo común	Medios abiertos con cultivos de secano y matorrales ,brezales	Todo el año
Jilguero	Zonas agrícolas y bosques abiertos con mosaico de herbazales, linderos. Arbolados de <i>pinus</i>	Todo el año
Agateador europeo	Arbolados maduros de coníferas	Todo el año
Ruiseñor bastardo	Vegetación de ribera o humedales	Todo el año
Verderón	Arbolados dispersos	Todo el año
Mirlo acuático	Ríos de buena calidad, poco alterado y con afloramiento de piedras	Todo el año
Paloma bravía	Roquedos, barrancos rocosos de montaña y cortados fluviales	Todo el año
Paloma Bravía/Doméstica	Construcciones humanas	Todo el año
Paloma zurita	Arboledas, estepas y cultivos de cereal de secano donde haya oquedades para nidificar	Todo el año
Paloma torcaz	Arbolados, y también matorrales y cultivos con arbolado dispersos	Todo el año
Cuervo grande	Cortados rocosos y canitles	Todo el año
Corneja común	Medios abiertos con arbolado disperso y cultivos	Todo el año
Grajilla	Cortados rocosos, paredones y desplomes	Todo el año
Herrerillo común	Arbolados de <i>Quercus</i> y de frondosas	Todo el año
Pico picapinos	Arbolados de <i>pinus</i> relativamente maduros	Todo el año
Escribano triguero	Zonas agrícolas con cultivo herbáceos	Todo el año
Escribano montesino	Medios abiertos con pastos o laderas rocosas con matorral	Todo el año
Escribano soteño	Todo tipo de arbolados	Todo el año
Petirrojo europeo	Cualquier tipo de bosque	Todo el año
Halcón peregrino	Medios abiertos y/o cultivos con cortados rocosos	Todo el año
Cernícalo vulgar	Zonas agrícolas en alternancia con barbechos	Todo el año
Pinzón vulgar	Todo tipo de arbolados	Todo el año
Focha común	Zonas húmedas	Todo el año
Cogujada común	Medios abiertos, cultivos de cereal, en el entorno de pueblos, ciudades, carreteras y caminos	Todo el año
Cogujada montesina	Medios abiertos con matorral bajo disperso jarales, espartales, garriga y coscojares	Todo el año
Gallineta común	Zonas húmedas	Todo el año
Arrendajo euroasiático	Todo tipo de arbolados	Todo el año

Tabla. Aves que se pueden observar a lo largo del camino de Lluçena a Sant Joan de Penyagolosa categorizadas por hábitat potencial y época del año en la que se pueden observar. Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de avifauna SEO/BirdLife.

Águila calzada	Arbolados con heterogeneidad de zonas abiertas, matorrales y cultivos de secano	Todo el año
Zarcero pálido	Vegetación de ribera	Todo el año
Torcecuello euroasiático	Áreas parcialmente arboladas, con sotos, bosquetes isla o dehesas	Todo el año
Alcaudón real	Medios abiertos, con árboles y arbustos dispersos, y en parajes con cultivos	Todo el año
Herrerillo capuchino	Arbolados de pino resinero y silvestre, aunque también en arbolados de <i>Quercus</i> y <i>Juniperus</i>	Todo el año
Piquituerto común	Arbolados de pino carrasco, pino laricio, pino silvestre y pino salgareño. Fácilmente observable en las ramas más altas	Todo el año
Alondra totovía	Medios abiertos con matorral disperso	Todo el año
Roquero solitario	Ambientes secos con roquedos, acantilados	Todo el año
Lavandera blanca	Ambientes próximos a agua dulce, desde ríos y charcas a huertos	Todo el año
Lavandera cascadeña	Torrentes de agua dulce con fondo rocoso y corriente rápida	Todo el año
Collalba negra	Ambientes áridos sin vegetación y con escarpes rocosos o muros de piedra	Todo el año
Carbonero común	Arbolados dispersos	Todo el año
Gorrión común	Ambientes humanizados próximos a terrenos agrícolas y medios abiertos	Todo el año
Gorrión molinero	Zonas agrícolas con arbolado disperso y eriales	Todo el año
Carbonero garrapinos	Arbolados de <i>pinus</i> de ambientes frescos	Todo el año
Gorrión chillón	Medios abiertos con roquedos y terrenos agrícolas	Todo el año
Colirrojo tizón	Medios secos y soleados con vegetación escasa y abundantes roquedos	Todo el año
Urraca	Medios agrícolas con bosquetes y árboles aislados	Todo el año
Pito real	Gran variedad de hábitats forestales, semiforestales o zonas agrícolas con arbolado	Todo el año
Acentor común	Matorrales y ambientes arbustivos de todo tipo	Todo el año
Avión roquero	Roquedos calizos	Todo el año
Chova piquirroja	Paredes rocosas verticales, se alimenta en espacios abiertos	Todo el año
Reyezuelo listado	Arboledas de <i>pinus</i> , <i>juniperus</i> y <i>quercus</i>	Todo el año
Tarabilla europea	Medios abiertos con mosaicos de cultivo y matorral disperso (tomillares y brezales)	Todo el año
Verderón serrano	Medios abiertos con rodales o formaciones densas de pino silvestre, pino laricio o salgareño	Todo el año
Serín verdicillo	Arbolados abiertos y paisajes agrarios	Todo el año
Trepador azul	Arboledas maduras de <i>quercus</i> y pino silvestre y pino laricio. También en vegetación de ribera	Todo el año
Tórtola turca	Medios urbanos, suburbanos y su entorno	Todo el año
Cárabo común	Arboledas de todo tipo e incluso, cortados, taludes arenosos y construcciones humanas	Todo el año
Estornino negro	Entornos humanizados	Todo el año
Curruca capirotada	Arboledas con abundante sotobosque	Todo el año
Curruca cabecinegra	Matorral mediterráneo esclerófilo de porte medio	Todo el año
Curruca rabilarga	Matorral esclerófilo y zonas abiertas con arbolado disperso	Todo el año
Chochín	Sotobosques ribereños	Todo el año
Mirlo común	Todo tipo de arbolados, mosaicos agrícolas y formaciones de matorral	Todo el año
Zorzal común	Todo tipo de arbolados, mosaicos agrícolas y formaciones de matorral	Todo el año
Zorzal charlo	Todo tipo de arboledas	Todo el año
Lechuza común	Medios abiertos o semiarbolados por debajo de los 1000m	Todo el año
Abubilla	Formaciones boscosas abiertas	Todo el año
Bisbita campestre	Zona seca con matorral bajo disperso y cultivos de secano	Primavera-verano
Vencejo común	Construcciones humanas	Primavera-verano

Tabla. Aves que se pueden observar a lo largo del camino de Lluca a Sant Joan de Penyagolosa categorizadas por hábitat potencial y época del año en la que se pueden observar. Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de avifauna SEO/BirdLife.

Terrera común	Paramos, estepas y cultivos de cereal de secano	Primavera-verano
Chotacabras europeo	Zonas abiertas con arbolado disperso	Primavera-verano
Chotacabras cuellirrojo	Medios abiertos ligeramente arbolados en mosaico con cultivos y eriales	Primavera-verano
Golondrina dáurica	Enclaves rocosos con aceptación de construcciones en el campo. Se alimenta en bosques, matorrales y pastizales	Primavera-verano
Culebrera europea	Arbolados con heterogeneidad de zonas abiertas, matorrales y cultivos de secano	Primavera-verano
Aguilucho cenizo	Medios abiertos y desarbolados, herbazales, brezales y cultivos de cereal	Primavera-verano
Cuco común	Cualquier ambiente forestal	Primavera-verano
Avión común	Construcciones humanas en pueblos. Presas y puentes. En ocasiones en roquedos	Primavera-verano
Escribano hortelano	Matorral bajo disperso de brezo y genista y cultivos de secano	Primavera-verano
Alcotán europeo	En bosquetes de <i>pinus</i> próximos a áreas abiertas	Primavera-verano
Zarcero común	Vegetación de ribera o arboledas con matorrales densos	Primavera-verano
Golondrina común	Construcciones humanas campestres para nidificar. Se alimenta en todo tipo de medios	Primavera-verano
Alcaudón común	Medios abiertos con arbolado y matorral disperso	Primavera-verano
Ruiseñor común	Vegetación de ribera. Bosques con arbustos, campiñas de cereal con linderos de arbustos	Primavera-verano
Abejaruco europeo	Cortados, taludes o paredes verticales de consistencia arenosa	Primavera-verano
Roquero rojo	Ambientes rocosos con matorrales dispersos, brezos o enebros	Primavera-verano
Papamoscas gris	Arbolados con matorrales y zonas húmedas cercanas	Primavera-verano
Collalba rubia	Zonas deforestadas y eriales con escasa cobertura herbácea y arbustos dispersos, así como viñedos, algunos cultivos arbóreos (olivares, almendrales) y bosques mediterráneos abiertos (dehesas)	Primavera-verano
Collalba gris	Matorrales bajos con roquedos	Primavera-verano
Oropéndola europea	Todo tipo de arbolados	Primavera-verano
Autillo europeo	Pinares abiertos y robledales, aunque ocupa diversidad de arbolados no densos	Primavera-verano
Colirrojo real	Arbolados de <i>Quercus</i> no densos	Primavera-verano
Mosquitero papialbo	Arbolados preferiblemente de caducifolios	Primavera-verano
Tórtola europea	Medios abiertos con pastizales y cultivos con setos arbolados, pequeños bosquetes, bosques de ribera, siempre con presencia cercana de cursos de agua	Primavera-verano
Curruca carrasqueña	Matorrales: jarales, retamares, brezales, coscojares. También arboledas de <i>pinus</i> y <i>juniperus</i> con abundante sotobosque de porte arbustivo.	Primavera-verano
Curruca zarcera	Matorrales, mosaicos de pastizales y matorral, arbustos de borde forestal	Primavera-verano
Curruca tomillera	Medios abiertos secos con formaciones de tomillar o brezales	Primavera-verano
Curruca mirlona	Arboledas de <i>pinus</i> , <i>juniperus</i> y <i>quercus</i> poco densas y	Primavera-verano

Tabla. Aves que se pueden observar a lo largo del camino de Lluca a Sant Joan de Penyagolosa categorizadas por hábitat potencial y época del año en la que se pueden observar. Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de avifauna SEO/BirdLife.

Vencejo real	Cortados verticales, aunque también puentes o presas	Primavera-verano
Bisbita pratense	Medios abiertos	Invierno
Bisbita alpino	Medios abiertos	Invierno
Lúgano	Arbolados de pino silvestre pino laricio. También en zonas agrícolas	Invierno
Agateador norteño	Arbolado de pino silvestre y pino laricio	Invierno
Aguilucho pálido	Medios abiertos con cultivos de secano, matorrales y arbolado disperso	Invierno
Esmerejón	Zonas abiertas y llanas, estepas cerealistas y matorral ralo	Invierno
Pinzón real	Arbolados de pino silvestre	Invierno
Acentor alpino	Canchales y zonas rocosas entre manchas de vegetación como enebros rastreros o praderas	Invierno
Estornino pinto	Medios agrícolas: pastizales y cultivos, viñedos y prados además de formaciones de matorral mediterráneo	Invierno
Treparriscos	Paredes calizas escarpadas	Invierno
Zorzal alirrojo	Arboledas de <i>pinus</i> y <i>quercus</i> , también frutales y olivares con setos y arbolado bajo cercano	Invierno
Zorzal real	Por encima de los 1300m en arboledas de <i>pinus</i> próximos a arbustos y pastizales	Invierno

Tabla. Aves que se pueden observar a lo largo del camino de Lluca a Sant Joan de Penyagolosa categorizadas por hábitat potencial y época del año en la que se pueden observar. Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de avifauna SEO/BirdLife.