

AVIFAUNA DEL ITINERARIO DE PUERTOMINGALVO A SANT JOAN DE PENYAGOLOSA

| <i>Nombre común</i> | <i>Hábitat preferente de observación</i> | <i>Época de observación</i> |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| Azor común | Arbolado de <i>pinus</i> y <i>quercus</i> en mosaico con matorral esclerófito y áreas abiertas | Todo el año |
| Gavilán común | Arbolado de <i>pinus</i> y <i>quercus</i> con buena cobertura | Todo el año |
| Mito | Arbolado en mosaico con matorral desarrollado | Todo el año |
| Alondra común | Cultivos con pastizales y matorral ralo como brezales o tomillares y aliagar mediterráneo | Todo el año |
| Martin pescador común | Zonas húmedas | Todo el año |
| Perdiz roja | Zonas agrícolas de secano con mosaico de matorral mediterráneo y arbolado disperso | Todo el año |
| Bisbita campestre | Zona seca con matorral bajo disperso y cultivos de secano | Primavera-verano |
| Bisbita pratense | Medios abiertos | Invierno |
| Bisbita alpino | Medios abiertos | Invierno |
| Vencejo común | Construcciones humanas | Primavera-verano |
| Águila real | Cortados rocosos y canitles | Todo el año |
| Águila perdicera | Cortados rocosos y canitles | Todo el año |
| Búho chico | Arbolados de <i>pinus</i> | Todo el año |
| Mochuelo europeo | Zonas agrícolas con arbolado disperso y eriales | Todo el año |
| Búho real | Roquedos, canchales, barrancos rocosos | Todo el año |
| Terrera común | Paramos, estepas y cultivos de cereal de secano | Primavera-verano |
| Chotacabras europeo | Zonas abiertas con arbolado disperso | Primavera-verano |
| Pardillo común | Medios abiertos con cultivos de secano y matorrales ,brezales | Todo el año |
| Jilguero | Zonas agrícolas y bosques abiertos con mosaico de herbazales, linderos. Arbolados de <i>pinus</i> | Todo el año |
| Lúgano | Arbolados de pino silvestre y pino laricio. También en zonas agrícolas | Invierno |
| Agateador europeo | Arbolados maduros de coníferas | Todo el año |
| Agateador norteño | Arbolado de pino silvestre y pino laricio | Invierno |
| Ruiseñor bastardo | Vegetación de ribera o humedales | Todo el año |
| Verderón | Arbolados dispersos | Todo el año |
| Mirlo acuático | Ríos de buena calidad, poco alterado y con afloramiento de piedras | Todo el año |
| Culebrera europea | Arbolados con heterogeneidad de zonas abiertas, matorrales y cultivos de secano | Primavera-verano |
| Aguilucho pálido | Medios abiertos con cultivos de secano, matorrales y arbolado disperso | Invierno |
| Críalo europeo | Parásito de la Urraca (<i>Pica pica</i>), por lo tanto presente en los mismos lugares | Primavera-verano |
| Paloma bravía | Roquedos, barrancos rocosos de montaña y cortados fluviales | Todo el año |
| Paloma Bravía/Doméstica | Construcciones humanas | Todo el año |
| Paloma zurita | Arboledas, estepas y cultivos de cereal de secano donde haya oquedades para nidificar | Todo el año |
| Paloma torcaz | Arbolados, y también matorrales y cultivos con arbolado dispersos | Todo el año |
| Cuervo grande | Cortados rocosos y canitles | Todo el año |

Tabla. Aves que se pueden observar a lo largo del camino de Puertomingalvo a Sant Joan de Penyagolosa categorizadas por hábitat potencial y época del año en la que se pueden observar.
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de avifauna SEO/BirdLife.

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| Corneja común | Medios abiertos con arbolado disperso y cultivos | Todo el año |
| Grajilla | Cortados rocosos, paredones y desplomes | Todo el año |
| Cuco común | Cualquier ambiente forestal | Primavera-verano |
| Herrerillo común | Arbolados de <i>Quercus</i> y de frondosas | Todo el año |
| Avión común | Construcciones humanas en pueblos. Presas y puentes. En ocasiones en roquedos | Primavera-verano |
| Pico picapinos | Arbolados de <i>pinus</i> relativamente maduros | Todo el año |
| Escribano triguero | Zonas agrícolas con cultivo herbáceos | Todo el año |
| Escribano montesino | Medios abiertos con pastos o laderas rocosas con matorral | Todo el año |
| Escribano soteño | Todo tipo de arbolados | Todo el año |
| Escribano hortelano | Matorral bajo disperso de brezo y genista y cultivos de secano | Primavera-verano |
| Petirrojo europeo | Cualquier tipo de bosque | Todo el año |
| Esmerejón | Zonas abiertas y llanas, estepas cerealistas y matorral ralo | Invierno |
| Halcón peregrino | Medios abiertos y/o cultivos con cortados rocosos | Todo el año |
| Alcotán europeo | En bosquetes de <i>pinus</i> próximos a áreas abiertas | Primavera-verano |
| Cernícalo vulgar | Zonas agrícolas en alternancia con barbechos | Todo el año |
| Papamoscas cerrojillo | Arbolados, preferiblemente de pino silvestre y roble, maduros | Primavera-verano |
| Pinzón vulgar | Todo tipo de arbolados | Todo el año |
| Pinzón real | Arbolados de pino silvestre | Invierno |
| Cogujada común | Medios abiertos, cultivos de cereal, en el entorno de pueblos, ciudades, carreteras y caminos | Todo el año |
| Cogujada montesina | Medios abiertos con matorral bajo disperso jarales, espartales, garriga y coscojares | Todo el año |
| Gallineta común | Zonas húmedas | Todo el año |
| Arrendajo euroasiático | Todo tipo de arbolados | Todo el año |
| Buitre leonado | Cortados rocosos próximos a zonas abiertas | Todo el año |
| Zarcero pálido | Vegetación de ribera | Todo el año |
| Zarcero común | Vegetación de ribera o arboledas con matorrales densos | Primavera-verano |
| Golondrina común | Construcciones humanas campestres para nidificar. Se alimenta en todo tipo de medios | Primavera-verano |
| Torcecuello euroasiático | Áreas parcialmente arboladas, con sotos, bosquetes isla o dehesas | Todo el año |
| Alcaudón real | Medios abiertos, con árboles y arbustos dispersos, y en parajes con cultivos | Todo el año |
| Alcaudón común | Medios abiertos con arbolado y matorral disperso | Primavera-verano |
| Herrerillo capuchino | Arbolados de pino resinero y silvestre, aunque también en arbolados de <i>Quercus</i> y <i>Juniperus</i> | Todo el año |
| Piquituerto común | Arbolados de pino carrasco, pino laricio, pino silvestre y pino salgareño. Fácilmente observable en las ramas más altas | Todo el año |
| Alondra totovía | Medios abiertos con matorral disperso | Todo el año |
| Ruiseñor común | Vegetación de ribera. Bosques con arbustos, campiñas de cereal con linderos de arbustos | Primavera-verano |
| Abejaruco europeo | Cortados, taludes o paredes verticales de consistencia arenosa | Primavera-verano |
| Roquero rojo | Ambientes rocosos con matorrales dispersos, brezos o enebros | Primavera-verano |
| Roquero solitario | Ambientes secos con roquedos, acantilados | Todo el año |
| Lavandera blanca | Ambientes próximos a agua dulce, desde ríos y charcas a huertos | Todo el año |

Tabla. Aves que se pueden observar a lo largo del camino de Puertomingalvo a Sant Joan de Penyagolosa categorizadas por hábitat potencial y época del año en la que se pueden observar.
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de avifauna SEO/BirdLife.

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| Lavandera cascadeña | Torrentes de agua dulce con fondo rocoso y corriente rápida | Todo el año |
| Papamoscas gris | Arbolados con matorrales y zonas húmedas cercanas | Primavera-verano |
| Alimoche común | Cortados, escarpes rocosos o cantiles en las proximidades de medios abiertos con ganadería | Todo el año |
| Collalba rubia | Zonas deforestadas y eriales con escasa cobertura herbácea y arbustos dispersos, así como viñedos, algunos cultivos arbóreos (olivares, almendrales) y bosques mediterráneos abiertos (dehesas) | Primavera-verano |
| Collalba negra | Ambientes áridos sin vegetación y con escarpes rocosos o muros de piedra | Todo el año |
| Collalba Gris | Matorrales bajos con roquedos | Primavera-verano |
| Oropéndola europea | Todo tipo de arbolados | Primavera-verano |
| Autillo europeo | Pinares abiertos y robledales, aunque ocupa diversidad de arbolados no densos | Primavera-verano |
| Carbonero común | Arbolados dispersos | Todo el año |
| Gorrión común | Ambientes humanizados próximos a terrenos agrícolas y medios abiertos | Todo el año |
| Gorrión molinero | Zonas agrícolas con arbolado disperso y eriales | Todo el año |
| Carbonero garrapinos | Arbolados de <i>pinus</i> de ambientes frescos | Todo el año |
| Gorrión chillón | Medios abiertos con roquedos y terrenos agrícolas | Todo el año |
| Colirrojo tizón | Medios secos y soleados con vegetación escasa y abundantes roquedos | Todo el año |
| Mosquitero papialbo | Arbolados preferiblemente de caducifolios | Primavera-verano |
| Urraca | Medios agrícolas con bosquetes y árboles aislados | Todo el año |
| Pito real | Gran variedad de hábitats forestales, semiforestales o zonas agrícolas con arbolado | Todo el año |
| Acentor alpino | Canchales y zonas rocosas entre manchas de vegetación como enebros rastreros o praderas | Invierno |
| Avión roquero | Roquedos calizos | Todo el año |
| Chova piquirroja | Paredes rocosas verticales, se alimenta en espacios abiertos | Todo el año |
| Reyezuelo listado | Arboledas de <i>pinus</i> , <i>juniperus</i> y <i>quercus</i> | Todo el año |
| Reyezuelo sencillo | Arboledas húmedas | Invierno |
| Tarabilla europea | Medios abiertos con mosaicos de cultivo y matorral disperso (tomillares y brezales) | Todo el año |
| Serín verdicillo | Arbolados abiertos y paisajes agrarios | Todo el año |
| Tórtola turca | Medios urbanos, suburbanos y su entorno | Todo el año |
| Tórtola europea | Medios abiertos con pastizales y cultivos con setos arbolados, pequeños bosquetes, bosques de ribera, siempre con presencia cercana de cursos de agua | Primavera-verano |
| Cárabo común | Arboledas de todo tipo e incluso, cortados, taludes arenosos y construcciones humanas | Todo el año |
| Estornino negro | Entornos humanizados | Todo el año |
| Estornino pinto | Medios agrícolas: pastizales y cultivos, viñedos y prados además de formaciones de matorral mediterráneo | Invierno |
| Curruca capirotada | Arboledas con abundante sotobosque | Todo el año |
| Curruca carrasqueña | Matorrales: jarales, retamares, brezales, coscojares. También arboledas de <i>pinus</i> y <i>juniperus</i> con abundante sotobosque de porte arbustivo. | Primavera-verano |
| Curruca zarcera | Matorrales, mosaicos de pastizales y matorral, arbustos de borde forestal | Primavera-verano |
| Curruca cabecinegra | Matorral mediterráneo esclerófilo de porte medio | Todo el año |

Tabla. Aves que se pueden observar a lo largo del camino de Puertomingalvo a Sant Joan de Penyagolosa categorizadas por hábitat potencial y época del año en la que se pueden observar.
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de avifauna SEO/BirdLife.

| | | |
|-------------------|--|-------------|
| Curruca rabilarga | Matorral esclerófilo y zonas abiertas con arbolado disperso | Todo el año |
| Treparriscos | Paredes calizas escarpadas | Invierno |
| Chochín | Sotobosques ribereños | Todo el año |
| Zorzal alirrojo | Arboledas de <i>pinus</i> y <i>quercus</i> , también frutales y olivares con setos y arbolado bajo cercano | Invierno |
| Mirlo común | Todo tipo de arbolados, mosaicos agrícolas y formaciones de matorral | Todo el año |
| Zorzal real | Por encima de los 1300m en arboledas de <i>pinus</i> próximos a arbustos y pastizales | Invierno |
| Zorzal charlo | Todo tipo de arboledas | Todo el año |
| Lechuza común | Medios abiertos o semiarbolados por debajo de los 1000m | Todo el año |
| Abubilla | Formaciones boscosas abiertas | Todo el año |